

HIPRADOG® DP

LOS AMA
EL DOBLE

LIVE VACCINE FOR THE
PREVENTION OF
CANINE PARVOVIRUS
INFECTION AND



Vacuna viva frente al **moquillo**,
en liofilizado inyectable y
parvovirus canina, en
suspensión inyectable



MAYOR COBERTURA FRENTE AL PARVOVIRUS CANINO⁽¹⁾



100%
Ag PARVOVIRUS




100%
Ag MOQUILLO



APERTURA DE FÁCIL USO Y
MEJOR PROTECCIÓN MEDIANTE
EL SISTEMA "FLIP-OFF"

Evolución del porcentaje de animales protegidos frente a CPV⁽¹⁾



● **HIPRADOG® DP**

● **Vacuna N**

Después de recibir 2 dosis de vacuna y 4 semanas después de la 2ª vacunación, se observó que el 94% de los animales vacunados con HIPRADOG® DP estaban protegidos frente a CPV (1)

* Diferencias estadísticamente significativas (p<0.05)

Parvovirus	✓	≥10 ⁷ *
Moquillo	✓	≥10 ⁵ *

* Expresado en DICT₅₀ (dosis infecciosas del 50 % del cultivo tisular)

1. Mas, G.; Cesio, M.; Blanch, M.; Baratelli, M. Antibody response against canine parvovirus of client-owned puppies after vaccination with bivalent or multivalent vaccines containing live attenuated strains. Congreso Veterinario De Colombia (CVDC), Pereira, Agosto 2020

HIPRADOG® DP Vacuna viva, Moquillo, en liofilizado inyectable; y Parvovirus canina, en suspensión inyectable. **COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ml):** Fracción liofilizada: Virus vivo moquillo (CDV) cepa Lederle_10, DICT₅₀; Fracción líquida: Virus vivo parvovirus canina (CPV) cepa C-780916_10, DICT₅₀. **INDICACIONES:** Perros: Prevención de Parvovirus y Moquillo. **CONTRAINDICACIONES:** No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o que estén incubando una enfermedad infectocontagiosa. Como no se ha demostrado la inocuidad de esta vacuna en hembras gestantes, no se aconseja su utilización en estos animales. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse el tratamiento sintomático adecuado. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea. **POSOLÓGIA:** Perros: 1 ml/perro, independientemente de su peso, edad, sexo y raza. Trasvasar, mediante una jeringa, la fracción líquida al frasco que contiene la fracción liofilizada, asegurando una completa reconstitución de la vacuna, antes de proceder a su administración. **PRECAUCIONES ESPECIALES:** Usar la vacuna inmediatamente después de ser reconstituida. Guardar entre +2 y +8 °C, al abrigo de la luz. No congelar. **PRESENTACIÓN:** Envase 10 ds (fracción liofilizada + fracción líquida). **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) España. Tel. (972)430660. **CONDICIONES DE DISPENSACIÓN:** Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Use los medicamentos responsablemente.